

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 183  
du 16 octobre 1990

- Traitements d'automne des arbres fruitiers
- Salades : Surveillez les plantations
- Agrumes : Les populations de cératites diminuent
- La mouche de l'olive encore possible.

### ARBRES FRUITIERS

Les traitements d'automne doivent intervenir pendant la chute des feuilles.

#### **\*\* Maladies bactériennes - corynéum du pêcher, nectarinier, cerisier, prunier**

Réalisez une application sur bois bien aoutés, avec une spécialité cuprique à raison de 250 g de cuivre métal par hl.  
Attention = éviter sur variétés mal aoutés sensibles au cuivre, notamment Armking.  
Si une forte pluie survenait renouvelez le traitement.

#### **\*\* Chancre à fusicoccum sur pêcher et nectarinier**

le parasite pénètre au niveau des plaies formées aux points d'attaches des pedoncles, à la chute des feuilles, et à l'occasion des pluies.

Selon l'importance et la fréquence des pluies, réalisez 1 à 3 traitements pendant la chute des feuilles avec l'un des produits suivants :

benomyl	50 g ma/hl	BENLATE
carbendazime	50 g ma/hl	NS
methyaltiophanate	120 g ma/hl	PELT 44

## SALADES

Les petites précipitations et les températures élevées que nous connaissons actuellement sont favorables au développement des maladies cryptogamiques. Il est indispensable de protéger les salades contre le mildiou et le botrytis en associant les deux fongicides, les matières actives et les doses figurent au tableau suivant.

GROUPE CHIMIQUE	MATIERE ACTIVE		EFFICACE CONTRE :			
	Nom	Dose g/are	Mildiou (bremia)	Botrytis	Sclérotinia	Rhizoctonia solani
Dithiocarbamates	Mancozèbe	16	+++			
	Manèbe	16	+++			
	Zinèbe	20	+++			
Dicarboximides :	Iprodione	7,5		+++	++	
	Procymidone* (1)	7,5		+++	++	
	Vinchlozoline (1)	7,5		+++	++	
Amines	Mepronil	7,5				++
Phenylurées	Pencycuron	7,5				++
Associations	contre le mildiou, en association avec mancozèbe : - Cymoxanil (Fulvax, Rémitine : 20 g/are) - Phoséthyl d'Aluminium (Rhodax : 25 g/are) - Oxadixyl + cymoxanil (Pulsan : 20 g/are)					

Efficacité : + faible      ++ moyenne      +++ bonne

\* Interdit en SUISSE sur salades

(1) Risque de phytotoxicité sur jeunes plantes, ou associé à un insecticide.

Remarque = Le thirame n'est plus autorisé après plantation.

```

=====
: Les traitements seront impérativement arrêtés :
: au stade 16-18 feuilles de plus de 3 cm² :
=====

```

## AGRUMES

Les populations de **cératites** commencent à diminuer. Les précipitations régulières, parfois abondantes y contribuent largement. Surveillez toutefois les variétés précoces.

## OLIVIER

Les mouches de l'olive sont encore bien présentes en toutes régions. Il peut encore être intéressant d'effectuer un traitement curatif mais si les olives ont tourné c'est inutile.